

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-6-81812206

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 70 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 20 - 24 Juin 1981

V I G N E

MILDIU : Les pluies des 8 et 9 juin ont été à l'origine de contaminations et actuellement des taches, qui restent malgré tout assez rares, sont observées dans la plupart des vignobles. Les prochaines pluies pourraient être à l'origine d'une extension de la maladie d'autant que les vignes sont à un stade encore très sensible (pleine floraison - nouaison).

Nous rappelons le traitement conseillé au début de la semaine du 22 au 26 juin.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES : Les conditions météorologiques ont été assez favorables à l'activité de ce ravageur. Aussi il est conseillé de renouveler la protection dès réception de ce bulletin.

Pour les produits se référer à notre bulletin n° 18 du 11 juin 1981.

TAVELURES : Dans les vergers où aucune tache n'est apparue, la protection peut être interrompue, dans les autres situations poursuivre la lutte.

OIDIUM DU POMMIER : Lors du traitement carpocapse, ajouter un anti-oïdium à la bouillie.

PETITS FRUITS

OIDIUM DU CASSISSIER : Des taches d'oïdium sont observées dans de nombreuses plantations. Une dernière application avant récolte est conseillée dans les meilleurs délais.

ACARIENS : Des attaques d'acariens sont notées sur certaines parcelles. Surveiller vos cultures et intervenir si nécessaire avec un acaricide spécifique en veillant à bien respecter le délai d'emploi avant récolte.

HOUBLON

MILDIU : Maintenir la protection.

OIDIUM : Dans les parcelles infestées l'année dernière par cette maladie, il est recommandé d'ajouter dès maintenant un anti-oïdium à la bouillie anti-mildiou.

CULTURES LÉGUMIÈRES

MILDIU DE LA POMME DE TERRE : Les premiers foyers de mildiou ont été découverts dans différents secteurs : RECOLOGNE (DOUBS), COSNE COURS SUR LOIRE (NIÈVRE). Un renouvellement du traitement doit être envisagé sur toutes les cultures ne devant pas être récoltées prochainement.

MILDIU DE L'OIGNON et SEPTORIOSE DU CELERI : Renouveler la protection.

185

C É R É A L E S

PUCERONS : Les parcelles les plus tardives doivent être surveillées jusqu'au stade "grains laiteux". Rares sont les situations où un traitement se justifie. Le seuil d'intervention n'est atteint que très localement en SAONE-et-LOIRE, JURA et HAUTE-SAONE. Nous rappelons que le seuil d'intervention est de 1 épi sur 2 colonisé par au moins 5 pucerons. Pour le choix des produits, se référer à notre bulletin n° 18 du 11 juin 1981.

BETTERAVES

Les cultures couvrent le sol dans la majorité des cas.

PUCERONS : Les populations sont en évolution et quelques parcelles sont au seuil d'intervention soit :

- cinq petites colonies de pucerons noirs pour dix betteraves
- un puceron vert pour dix betteraves

Les produits efficaces sont assez nombreux mais on aura intérêt à préférer un produit systémique : *diméthoate*, *formothion*, *oxy-déméton méthyl*, *vamidothion*. Le *pirimicarbe* (*Pirimor* à 500 g./ha) non toxique pour les auxiliaires peut être utilisé pour son action de choc.

P. Le Chef de la Circonscription
L'Ingénieur en Chef d'Agronomie :

G. RIFFIOD